

滑石散

Huashi San

【处方】 滑石 60g 泽泻 45g 灯心草 15g 茵陈 30g
 知母(酒制)25g 黄柏(酒制)30g 猪苓 25g 瞿麦 25g

【制法】 以上 8 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为淡黄色的粉末；气香，味淡、微苦。

【鉴别】 (1)取本品，置显微镜下观察：不规则块片无色，有层层剥落的痕迹(滑石)。薄壁细胞类圆形，有椭圆形纹孔，集成纹孔群(泽泻)。草酸钙针晶成束或散在，长 26~110 μ m (知母)。纤维束鲜黄色，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维，含晶细胞的壁木化增厚(黄柏)。菌丝黏结成团，大多无色；草酸钙方晶正八面体形，直径 32~60 μ m (猪苓)。纤维束周围薄壁细胞 含草酸钙簇晶，形成晶纤维，含晶细胞纵向成行(瞿麦)。T 形非腺毛，具柄部及单细胞臂部，两臂不等长，壁厚，柄细胞 1~2 个(茵陈)。星状薄壁细胞彼此以星芒相接，形成大的三角形或四边形气腔(灯心草)。

(2)取本品 2g，加甲醇 20ml，加热回流 15 分钟，滤过，滤液浓缩至约 1ml，作为供试品溶液。另取黄柏对照药材 0.1g，同法制成对照药材溶液。再取盐酸小檗碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 0502)试验，吸取上述三种溶液各 1 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以~~环己烷-乙酸乙酯-异丙醇-甲醇-水-三乙胺 (6:7:2:3:1:2)~~ ~~苯-乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓氨试液 (6:3:1.5:1.5:0.5)~~ 为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定(附录 0101)。

【贮藏】 密闭，防潮。